

POISSONS DE GUINÉE FRANÇAISE RAPPORTÉS PAR M. P. CHABANAUD,

PAR M. LE D^r JACQUES PELLEGRIN.

M. Paul Chabanaud, lors de son voyage en Guinée française (1919-1920), a recueilli une petite collection de Poissons qui renferme quelques formes intéressantes ou qui n'avaient pas encore été signalées dans ces régions.

Les échantillons ont été récoltés dans le marigot de Kérouané, en rapport avec le Milo, affluent de droite du Haut-Niger, dans le marigot de N'Zérékoré, qui appartient au bassin du Haut Saint-Paul, enfin à Dixine, aux environs de Konakry.

On en trouvera ci-dessous la liste par famille avec l'indication de la provenance.

MORMYRIDÆ.

MARCUSENIUS GALLARDI Pellegrin. — Kérouané.

CHARACINIDÆ.

SARCODAGES ODOË Bloch. — N'Zérékoré.

NANNETHIOPS UNITENIATUS Günther. — N'Zérékoré.

CYPRINIDÆ.

BARBUS SPURRELLI Boulenger. — Kérouané.

— TRISPILUS Bleeker. — N'Zérékoré.

SILURIDÆ.

HETEROBRANCHUS ISOPTERUS Bleeker. — N'Zérékoré.

CYPRINODONTIDÆ.

HAPLOCHILUS SEXFASCIATUS Peters. — N'Zérékoré.

CICHLIDÆ.

HEMICROMIS FASCIATUS Peters. — Dixine.

TILAPIA MELANOPLEURA A. Duméril. — Kérouané, N'Zérékoré.

GOBIIDÆ.

ELEOTRIS NANA Boulenger. — N'Zérékoré.

PERIOPHTHALMUS KOELREUTERI Pallas var. PAPILIO Bloch Schneider. — Dixine.

Le *Marcusenius Gaillardi* Pellegrin, voisin du *M. Lhuysi* Steindachner, du Sénégal, est un petit Mormyridé que j'ai fait connaître⁽¹⁾ d'après des spécimens rapportés de Bol, sur le lac Tchad, par le D^r Gaillard, attaché à la mission Tilho. Les affinités sont considérables entre la faune ichthyologique du Tchad et celle du Niger, et il n'est pas étonnant de trouver encore une espèce commune aux deux bassins.

Le *Barbus Spurrelli* Boulenger est un petit Barbeau, voisin du *B. ablabes* Blecker, décrit il y a quelques années par M. Boulenger⁽²⁾ d'après des spécimens de Sierra-Leone et de la Côte de l'Or. Son habitat s'étend maintenant jusqu'au Haut-Niger.

L'*Eleotris nana* Boulenger⁽³⁾, comme son nom l'indique, est une forme minuscule, qui d'après l'auteur qui l'a fait connaître atteindrait seulement 35 à 38 millimètres. Un des exemplaires rapportés par M. Chabanaud mesure une taille un peu supérieure : 45 millimètres. Les types provenaient du Haut Nil. J'ai signalé la présence de l'*Eleotris* naine dans le Chari, d'après des échantillons recueillis à Bangoran, par le regretté D^r Decorse, qui accompagnait la mission A. Chevalier. Le Poisson décrit de l'Ouélé (Haut-Congo) par M. Boulenger⁽⁴⁾ sous le nom d'*E. uellensis* ne paraît pas séparable. Les matériaux rassemblés par M. Chabanaud montrent que l'habitat de cette curieuse petite espèce comprend non seulement les bassins du Nil, du Tchad et du Congo, mais encore l'Afrique occidentale.

⁽¹⁾ *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1909, p. 212 et Les Poissons du bassin du Tchad, 1914, p. 51, pl. I, fig. 2.

⁽²⁾ *Pr. Zool. Soc.*, 1913, p. 51, pl. III, fig. 1.

⁽³⁾ *Ann. Mag. Nat. Hist.* (7), VIII, 1901, p. 446.

⁽⁴⁾ *Rev. Zool. Afr.*, II, 1913, p. 161.